

## BACCALAUREAT BLANC

Terminale S – Epreuve de mathématiques.

Durée : 4 heures.

Chaque élève doit traiter les deux exercices et le problème. L'énoncé comporte 4 pages.

**ATTENTION** : l'exercice 2 est différent selon que vous ayez suivi ou non l'enseignement de spécialité. **Ne vous trompez pas d'énoncé !**

*La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*


L'utilisation d'une seule calculatrice est autorisée, ainsi que celle du formulaire officiel.

**Exercice 1 : (4 points)****Commun à tous les candidats**

Un carré de côté 20 cm est partagé selon les 10 zones suivantes :

- un disque  $D$  de rayon 1 cm
- 8 secteurs  $S_1, S_2, \dots, S_8$  de même aire délimités par les frontières du disque  $D$  et du disque  $D'$  de même centre et de rayon 9 cm
- une zone  $R$  entre le disque  $D'$  et le bord du carré.

On place un point aléatoirement dans le carré. La probabilité de placer le point dans une zone quelconque du carré est proportionnelle à l'aire de cette zone.




1. a. Déterminer la probabilité  $p(D)$  pour que le point soit placé dans le disque  $D$ .  
b. Déterminer la probabilité  $p(S_1)$  pour que le point soit placé dans le secteur  $S_1$ .
2. Pour cette question 2, on utilisera les valeurs approchées suivantes :  
 $p(D) = 0,008$  et, pour tout  $k$  appartenant à  $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ ,  $p(S_k) = 0,0785$ .

A cette situation aléatoire est associé le jeu suivant :

- un point placé dans le disque  $D$  fait gagner 10 euros
- un point placé dans le secteur  $S_k$  fait gagner  $k$  euros pour tout  $k$  appartenant à  $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$
- un point placé dans la zone  $R$  fait perdre 4 euros.

On note  $X$  la variable aléatoire égale au gain algébrique obtenu.

- a. Calculer la probabilité  $p(R)$  pour que le point soit placé dans la zone  $R$ .  
Calculer l'espérance de  $X$ .
- b. On joue deux fois de suite. On a donc placé deux points de manière indépendante dans le carré.  
Calculer la probabilité d'obtenir un gain total positif ou nul.
- c. Soit  $n$  un entier naturel supérieur ou égal à deux. On joue  $n$  fois de suite.  
On a donc placé  $n$  points de manière indépendante dans le carré.  
Calculer la probabilité  $p_n$  d'obtenir au moins un point placé dans le disque  $D$ .  
Déterminer la plus petite valeur de  $n$  tel que  $p_n \geq 0,9$ .



On considère un rectangle direct ABCD vérifiant :  $AB = 10$  cm et  $AD = 5$  cm.

- Faire une figure : construire ABCD, puis les images respectives M, N et P de B, C et D par la rotation  $r$  de centre A et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ .
- Construire le centre  $\Omega$  de la rotation  $r'$  qui vérifie  $r'(A) = N$  et  $r'(B) = P$ . Déterminer l'angle de  $r'$ .
  - Montrer que l'image de ABCD par  $r'$  est AMNP.
  - Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation  $r^{-1} \circ r'$ .
- On considère les images successives des rectangles ABCD et AMNP par la translation de vecteur  $\overrightarrow{DM}$ . Sur la demi-droite  $[DA)$ , on définit ainsi la suite de points  $(A_k)_{k \geq 1}$  vérifiant, en cm,  $DA_k = 5 + 15k$ . Sur la même demi-droite, on considère la suite de points  $(E_n)_{n \geq 1}$  vérifiant, en cm,  $DE_n = 6,55n$ .
  - Déterminer l'entier  $k$  tel que  $E_{120}$  appartienne à  $[A_k, A_{k+1}]$ . Que vaut la longueur  $A_k E_{120}$  en cm ?
  - On cherche dans cette question pour quelle valeur minimale  $n_0$  le point  $E_{n_0}$  est confondu avec un point  $A_k$ .  
Montrer que si un point  $E_n$  est confondu avec un point  $A_k$  alors  $131n - 300k = 100$   
Vérifier que les nombres  $n = 7100$  et  $k = 3100$  forment une solution de cette équation.  
Déterminer la valeur minimale  $n_0$  recherchée.

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité graphique 4 cm. On note A et B les points d'affixes respectives 1 et  $i$ .  
A tout point M, distinct de A et d'affixe  $z$ , est associé le point M' d'affixe Z définie par :

$$Z = \frac{(1-i)(z-i)}{z-1}$$

- Calculer l'affixe du point C' associé au point C d'affixe  $-i$ .
  - Placer les points A, B et C.
- Soit  $z = x + iy$  où  $x$  et  $y$  désignent deux nombres réels.
  - Montrer l'égalité :
 
$$Z = \frac{(x-1)^2 + (y-1)^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2} i$$
  - Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe  $z$  telle que Z soit réel.
  - Déterminer l'ensemble F des points M d'affixe  $z$  telle que  $\text{Re}(Z)$  soit négatif ou nul.
- Ecrire le nombre complexe  $(1-i)$  sous forme trigonométrique.
  - Soit M un point d'affixe  $z$ , distinct de A et de B. Montrer que :
 
$$\frac{(1-i)(z-i)}{z-1} \in \mathbb{R}^*$$
 si et seulement si il existe un entier  $k$  tel que  $\arg(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + k\pi$ .
  - En déduire l'ensemble des points M vérifiant  $\arg(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + k\pi$ .
  - Déterminer l'ensemble des points M vérifiant  $\arg(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ .

**Problème : (11 points)**

**Commun à tous les candidats**

**Partie A :**

1. Montrer que pour tout  $x > 0$ , on a :  $e^{2x} - 1 > 0$ .
2. Soit  $g$  la fonction définie sur  $]0 ; +\infty[$  par :  $g(x) = \frac{1}{e^{2x} - 1}$ .
  - a. Déterminer les limites de  $g$  en 0 et en  $+\infty$ . Interpréter graphiquement les résultats.
  - b. Calculer  $g'(x)$ . Etudier le sens de variation de  $g$  puis dresser son tableau de variation.

**Partie B :**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0 ; +\infty[$  dont la courbe représentative  $C$  dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  est donnée sur la feuille annexe avec sa tangente au point d'abscisse  $e$ .

On admet l'égalité suivante :  $f(x) = 2x [a(\ln x)^2 + b \ln x + c]$  où  $a, b$  et  $c$  désignent trois réels.

1.
  - a. Exprimer  $f'(x)$  en fonction de  $a, b$  et  $c$ .
  - b. À l'aide des informations données sur le graphique, déterminer les valeurs de  $f'\left(\frac{1}{e}\right)$ ,  $f'(\sqrt{e})$  et  $f'(e)$ .
  - c. En déduire l'égalité :  $f(x) = 2x [2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2]$  pour tout  $x \in ]0 ; +\infty[$ .
2.
  - a. Déterminer la limite de  $f$  en 0. On pourra poser  $t = -\ln x$  et vérifier pour tout  $x \in ]0 ; +\infty[$  l'égalité :
$$f(x) = 2e^{-t} [2t^2 + 3t + 2].$$
  - b. Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ .
  - c. Montrer pour tout  $x \in ]0 ; +\infty[$  l'égalité :  $f'(x) = 2(\ln x + 1)(2 \ln x - 1)$ .
  - d. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variation de  $f$ .

**Partie C :**

1. Tracer, dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  de la feuille annexe, la courbe représentative  $\Gamma$  de la fonction  $g$  étudiée en partie A.
2.
  - a. Montrer que pour tout  $x > 0$ , on a  $g(x) = \frac{e^{2x}}{e^{2x} - 1} - 1$ .
  - b. Calculer, et exprimer en unités d'aire, l'aire de la surface délimitée par l'axe des abscisses, la courbe  $\Gamma$  et les droites d'équation  $x = \frac{1}{4}$  et  $x = 2$ .
3. Soit  $\varphi$  la fonction définie sur  $[0,1 ; 0,3]$  par :  $\varphi(x) = f(x) - g(x)$ .
  - a. Montrer que, pour tout  $x$  appartenant à  $[0,1 ; 0,3]$ , on a :  $\varphi'(x) > 0$ .
  - b. Montrer que l'équation  $f(x) = g(x)$  possède une solution unique  $\alpha$  sur  $[0,1 ; 0,3]$  et déterminer un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude  $10^{-2}$ .

**Partie D :**

1. Montrer que pour tout  $x > 0$ ,  $f(x) > 0$ .
2. On définit la fonction  $h$  sur  $]0 ; +\infty[$  par l'expression suivante :  $h = g \circ f$ .
  - a. Déterminer les limites en 0 et en  $+\infty$  de  $h$ .
  - b. Déterminer le sens de variation de  $h$  sur  $]0 ; +\infty[$ .
  - c. Montrer que  $h(\alpha) = g \circ g(\alpha)$ . Déterminer une valeur approchée de  $h(\alpha)$  à  $10^{-4}$  près.

# courbe C

